

L'adolescence, un âge charnière

pour la vaccination

TABLEAUX DE SYNTHÈSE ^{1,2}

Primovaccination	
COVID-19	Recommandée à partir de 12 ans
Fièvre jaune	Obligatoire pour les résidents du département de la Guyane de plus de 12 mois ou pour toute personne y séjournant
Grippe saisonnière	Recommandée pour les adolescents atteints d'une maladie chronique sévère et/ou d'obésité, en cas de grossesse, ou en contact étroit avec une personne fragile
Hépatite A	Recommandée si/pour : <ul style="list-style-type: none">• hébergement dans un établissement pour l'enfance et la jeunesse handicapées• mucoviscidose ou maladie chronique du foie• hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes• entourage familial/vivant sous le même toit qu'une personne atteinte d'hépatite A• résidence dans une communauté en situation d'hygiène précaire avec un cas d'hépatite A
Papillomavirus humain	Recommandée à 14 ans
Méningites à <i>Hæmophilus influenzae</i> b (Hib)	Recommandée chez les adolescents non vaccinés atteints de certaines maladies du sang
Méningites et septicémies à méningocoques (ACYW, B)	Recommandée chez les adolescents non vaccinés atteints de certaines maladies du sang Vaccins contre les maladies invasives à méningocoque B : certains sont indiqués dès 2 mois alors que d'autres ne le sont pas avant l'âge de 10 ans Méningites et septicémies à méningocoque C : possible jusqu'à 24 ans révolus
Méningites, pneumonies et septicémies à pneumocoque	Recommandée chez les adolescents non vaccinés présentant un risque élevé d'infections sévères à pneumocoque

L'adolescence, un âge charnière

pour la vaccination

Rattrapages et rappels

Coqueluche	Rappel possible <ul style="list-style-type: none">• si vaccination datant de plus de 10 ans• si contact étroit avec une femme enceinte ou un nourrisson de moins de 6 mois
Hépatite B	Rattrapage recommandé jusqu'à 15 ans Recommandation particulière pour les adolescents non vaccinés à risque accru de contamination : <ul style="list-style-type: none">• accueillis dans les établissements pour l'enfance et la jeunesse handicapées ou dans les institutions psychiatriques• ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples• usagers de drogues injectables• susceptibles de recevoir des transfusions ou des médicaments dérivés du sang (hémophiles, dialysés, insuffisants rénaux, etc.)• candidats à une greffe d'organe, de tissu ou de cellules• détenus ou anciens détenus en prison• entourage ou partenaires sexuels d'une personne infectée par le virus de l'hépatite B ou porteuse chronique de l'antigène HBs
Papillomavirus humain	Rattrapage recommandé jusqu'à 19 ans
Tuberculose	Rattrapage possible jusqu'à 15 ans en cas de risque d'exposition à la maladie : <ul style="list-style-type: none">• naissance dans un pays où la tuberculose est fortement présente• dont au moins l'un des parents est originaire de l'un de ces pays• devant séjourner au moins 1 mois d'affilée dans l'un de ces pays• ayant un antécédent familial de tuberculose• résidant en Guyane ou à Mayotte• dans toute situation jugée à risque d'exposition au bacille tuberculeux par le médecin : conditions de logement défavorables, conditions socio-économiques précaires, contact régulier avec des adultes originaires d'un pays où la tuberculose est fortement présente
Varicelle	Rattrapage possible jusqu'à 18 ans pour les personnes n'ayant pas eu la varicelle ou, si c'est incertain : <ul style="list-style-type: none">• chez les jeunes femmes en âge de procréer, surtout si elles ont un projet de grossesse• chez les femmes, après une première grossesse et sous contraception efficace• chez toute personne dans l'entourage proche d'une personne atteinte de varicelle (dans les 3 jours suivant l'exposition)• chez toute personne en contact étroit avec des personnes immunodéprimées

Références

- 1) Vaccination-info-service. Adolescents (14 à 19 ans) <https://vaccination-info-service.fr/La-vaccination-au-cours-de-la-vie/Adolescents-14-a-19-ans>
- 2) Floret D. Vaccination des adolescents. Rev Prat 2017 ;31(986) :587-588