

L'adolescence, un âge charnière

pour la vaccination

TABLEAUX DE SYNTHÈSE ^(1,2)

Primovaccination

COVID-19	La vaccination doit se faire préférentiellement avec le vaccin ARNm adapté (Comirnaty®). Le vaccin à protéine recombinante Nuvaxovid XBB.1.5 peut être utilisé chez les adolescents de 12 ans et plus.
Fièvre jaune	Obligatoire pour les résidents du département de la Guyane de plus de 12 mois ou pour toute personne y séjournant .
Grippe saisonnière	Recommandée à tous les enfants de 2 à 17 ans révolus sans comorbidités. Pour les adolescents atteints d'une maladie chronique sévère et/ou d'obésité, en cas de grossesse, ou en contact étroit avec une personne fragile. Recommandée également en cas de contact étroit avec un nourrisson de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe graves.
Hépatite A	Recommandée si/pour : <ul style="list-style-type: none">• hébergement dans un établissement pour l'enfance et la jeunesse handicapées ;• mucoviscidose ou maladie chronique du foie ;• hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ;• entourage familial/vivant sous le même toit qu'une personne atteinte d'hépatite A ;• résidence dans une communauté en situation d'hygiène précaire avec un cas d'hépatite A.
Papillomavirus humain	Recommandée chez les filles et les garçons à partir de 11 ans.
Méningites à <i>Hæmophilus influenzae</i> b (Hib)	Recommandée chez les adolescents non vaccinés atteints de certaines maladies du sang.
Méningites et septicémies à méningocoque (ACWY, B, C)	Méningocoque de sérotype ACWY : chez l'adolescent de 11 à 14 ans. Méningocoque de sérotype C : possible jusqu'à 24 ans révolus. La vaccination contre les méningocoques de sérotypes A, C, Y et W et les méningocoques de sérotype B est recommandée chez les personnes immunodéprimées.
Méningites, pneumonies et septicémies à pneumocoque	Recommandée chez les adolescents non vaccinés présentant un risque élevé d'infections sévères à pneumocoque.

Références

1. Le calendrier des vaccinations, mise à jour 26 avril 2024 : <https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal>
2. <https://vaccination-info-service.fr/>

L'adolescence, un âge charnière

pour la vaccination

Rattrapages et rappels

Coqueluche	Rappel possible : <ul style="list-style-type: none">• si la vaccination date de plus de 10 ans ;• si contact étroit avec une femme enceinte ou un nourrisson de moins de 6 mois. En cas de projet de grossesse, cette vaccination est recommandée à partir du 2 ^e trimestre et de préférence entre les semaines d'aménorrhée 20 et 36.
Hépatite B	Rattrapage recommandé jusqu'à 15 ans. Recommandation particulière pour les adolescents non vaccinés à risque accru de contamination : <ul style="list-style-type: none">• accueillis dans les établissements pour l'enfance et la jeunesse handicapées ou dans les institutions psychiatriques ;• ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples ;• usagers de drogues injectables ;• susceptibles de recevoir des transfusions ou des médicaments dérivés du sang (hémophiles, dialysés, insuffisants rénaux, etc.) ;• candidats à une greffe d'organe, de tissu ou de cellules ;• détenus ou anciens détenus en prison ;• entourage ou partenaires sexuels d'une personne infectée par le virus de l'hépatite B ou porteuse chronique de l'antigène HBs ;• voyageurs dans les pays de moyenne ou forte endémie.
Papillomavirus humain	Rattrapage recommandé jusqu'à 19 ans. Et jusqu'à 26 ans pour les hommes ayant ou ayant eu des relations sexuelles avec des hommes.
Tuberculose	Rattrapage possible jusqu'à 15 ans en cas de risque d'exposition à la maladie : <ul style="list-style-type: none">• naissance dans un pays où la tuberculose est fortement présente ;• dont au moins l'un des parents est originaire de l'un de ces pays ;• devant séjourner au moins un mois d'affilée dans l'un de ces pays ;• ayant un antécédent familial de tuberculose ;• résidant en Guyane ou à Mayotte ;• dans toute situation jugée à risque d'exposition au bacille tuberculeux par le médecin : conditions de logement défavorables, conditions socio-économiques précaires, contact régulier avec des adultes originaires d'un pays où la tuberculose est fortement présente.
Varicelle	Rattrapage possible jusqu'à 18 ans pour les personnes n'ayant pas eu la varicelle ou, si c'est incertain : <ul style="list-style-type: none">• chez les jeunes femmes en âge de procréer, surtout si elles ont un projet de grossesse ;• chez les femmes, après une première grossesse et sous contraception efficace ;• chez toute personne dans l'entourage proche d'une personne atteinte de varicelle (dans les 3 jours suivant l'exposition) ;• chez toute personne en contact étroit avec des personnes immunodéprimées ;• chez une personne en attente de greffe.
Méningocoque de sérotype ACWY	Dans le cadre du rattrapage vaccinal, vaccination recommandée entre 15 et 24 ans révolus.